


Тихоокеанская черная казарка

Branta bernicla nigricans (Lawrence, 1846)

Отряд Гусеобразные — Anseriformes

Семейство Утиные — Anatidae



Категория и статус редкости вида в Якутии. Категория 3 — редкий, уязвимый подвид, сокращающийся в численности. Выделяются две популяции, определяемые по местам зимовок: американская и азиатская, последняя находится на грани исчезновения и гнездится исключительно на территории Якутии [1, 2].

Распространение. Населяет морское побережье, приморские острова, а также о-ва Ляховские и Анжу Новосибирского архипелага [1–10]. Во внутриконтинентальных районах встречается преимущественно во время весенних миграций в долинах крупных рек от Лены до Колымы [3, 11, 12]. На гнездовье распространена от дельты Колымы до Оленекского залива [13, 14]. Гнездовые местообитания азиатской популяции расположены, вероятно, только от Оленекского залива до дельты Яны [2]. Места зимовок расположены по побережью Америки от Алеутских островов до Мексики, также в Японии, Корее и Китае [2, 13, 15, 16].

Места обитания и образ жизни. Гнездовые местообитания — сильно обводненные участки полосы приморской тундры шириной 5–40 км преимущественно в дельтах крупных рек [1, 5–10]. Весенний пролет проходит с середины мая до начала третьей декады июня [7, 11]. Гнездится колониально, но могут встречаться и одиночные гнезда. Наиболее крупная колония известна на о-ве Хардыргастаах в дельте Лены [16]. К откладыванию яиц приступают в первой половине июня. В кладке 1–7 яиц [7, 8, 10].

Численность и лимитирующие факторы. Численность американской популяции оценивается в 126 500 и азиатской популяции — в 5000 особей [17]. Однако в настоящее время высказывается мнение о том, что азиатской популяции не существует как таковой [2, 18], так как происходит постоянный и довольно активный обмен птицами между Америкой, Юго-Восточной Азией и Россией. Рожденные на Аляске особи могут зимовать в Японии и лететь на гнездовье в Якутию.

К востоку от дельты Лены (на территории России) численность оценивается в 14 000–16 000 особей [19]. Известно,

что в дельте Оленька и западной окраине дельты Лены гнездится 600–800 птиц [9], в дельте Индигирки — 1700 особей [7]. Сведения о не размножающейся части популяции с основных мест линьки на Новосибирских о-вах ограничиваются наблюдением более 2000 линяющих птиц в бассейне р. Улахан-Юрях на о-ве Фаддеевский в 1994 г. [20]. Численность в дельте Лены растёт, и сейчас их гнездится здесь не менее 10–12 тыс. особей [18, 21].

В междуречье Индигирки и Алазеи гнездятся в устье р. Большой Хомус Юрях, линяющие особи отмечены в устье Колымской протоки — около 100 казарок в августе 2019 г.

Факторами, ограничивающими рост численности, прежде всего, необходимо считать хищничество, погодные условия (затяжная многоснежная весна), браконьерский отстрел [1, 9].

Принятые и необходимые меры охраны. Занесена в Красную книгу Российской

Федерации и ряд региональных Красных книг Восточной Азии. В области размножения и на путях пролета в Якутии охраняется системой особо охраняемых природных территорий.

Источники информации: 1. Сыроечковский, 1999; 2. Сыроечковский, 1995; 3. Воробьев, 1963; 4. Рутилевский, 1967; 5. Блохин, 1988; 6. Кречмар и др., 1991; 7. Дегтярев и др., 1995; 8. Поздняков и др., 1995; 9. Сыроечковский, 1997; 10. Волков и др., 1998; 11. Поздняков, Гермогенов, 1988; 12. Поздняков, 1997; 13. Сыроечковский, Литвин, 1998; 14. Syroechkovski et al., 1998; 15. Кищинский, Вронский, 1979; 16. Johnson, Herter, 1989; 17. Miyabayashi, Mundkur, 1999; 18. Поздняков, 2018; 19. Кондратьев, 1998а; 20. Syroechkovski, 1995; 21. Поздняков, 2019.

Составители:

В.И. Поздняков, И.П. Бысыкатова.